# 人間ドック施設利用者数の推移

施設名：大腸肛門病センター高野病院　総合健診センター

2025年4月10日現在

| 年　度 | 市町村総合健診 | 人間ドック | 定期健診 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 35 | 340 | 0 | 0 | 375 |
| 1993 | 228 | 296 | 9 | 0 | 533 |
| 1994 | 531 | 435 | 0 | 676 | 1,642 |
| 1995 | 909 | 429 | 7 | 142 | 1,487 |
| 1996 | 1,117 | 438 | 152 | 415 | 2,122 |
| 1997 | 1,377 | 511 | 163 | 484 | 2,535 |
| 1998 | 1,511 | 599 | 130 | 332 | 2,572 |
| 1999 | 1,714 | 485 | 136 | 363 | 2,698 |
| 2000 | 1,480 | 540 | 134 | 320 | 2,474 |
| 2001 | 1,544 | 591 | 172 | 267 | 2,574 |
| 2002 | 1,924 | 611 | 63 | 218 | 2,816 |
| 2003 | 2,064 | 959 | 513 | 172 | 3,708 |
| 2004 | 1,962 | 1,444 | 819 | 275 | 4,500 |
| 2005 | 1,827 | 1,830 | 1,013 | 391 | 5,061 |
| 2006 | 1,669 | 2,065 | 1,445 | 265 | 5,444 |
| 2007 | 1,555 | 2,187 | 1,298 | 244 | 5,284 |
| 2008 | 653 | 2,687 | 1,571 | 0 | 4,911 |
| 2009 | 987 | 2,894 | 1,884 | 0 | 5,765 |
| 2010 | 969 | 3,042 | 1,851 | 0 | 5,862 |
| 2011 | 1,001 | 3,244 | 2,064 | 0 | 6,309 |
| 2012 | 993 | 3,333 | 1,990 | 0 | 6,316 |
| 2013 | 957 | 3,442 | 2,023 | 0 | 6,422 |
| 2014 | 979 | 3,469 | 2,226 | 0 | 6,674 |
| 2015 | 784 | 3,543 | 2,367 | 0 | 6,694 |
| 2016 | 650 | 3,423 | 2,306 | 0 | 6,379 |
| 2017 | 738 | 3,429 | 2,188 | 0 | 6,355 |
| 2018 | 735 | 3,818 | 2,430 | 0 | 6,983 |
| 2019 | 540 | 4,201 | 2,502 | 0 | 7,243 |
| 2020 | 492 | 4,076 | 2,593 | 0 | 7,161 |
| 2021 | 512 | 4,337 | 2,769 | 0 | 7,618 |
| 2022 | 436 | 4,362 | 2,786 | 0 | 7,584 |
| 2023 | 397 | 4,637 | 2,743 | 0 | 7,777 |
| 2024 | 414 | 4,883 | 2,561 | 0 | 7,858 |
| 合計 | 33,684 | 76,580 | 44,908 | 4,564 | 159,736 |

# 2023年度実績

## (1)受診状況

2023年度の受診者集計は2023年4月1日～2024年3月31日で行った。

受診者総数7777名、男性3445名(44.3%)、女性4332名(55.7%)であった。(表1)

年齢分布は男性、女性ともには50歳代がピークで、平均年齢は男性50.5歳、女性48.2歳であった。(図1)

(表1) 年齢別受診者数

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 男 | 女 | 総計 |
| <20 | 35 | 29 | 64 |
| 20-29 | 264 | 428 | 692 |
| 30-39 | 459 | 630 | 1,089 |
| 40-49 | 789 | 1,131 | 1,920 |
| 50-59 | 945 | 1,252 | 2,197 |
| 60-69 | 640 | 650 | 1,290 |
| 70-79 | 287 | 192 | 479 |
| 80-89 | 24 | 19 | 43 |
| 90-99 | 2 | 1 | 3 |
| 総計 | 3,445 | 4,332 | 7,777 |

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| コース | 男 | 女 | 総計 |
| 人間ドック | 1,761 | 1,607 | 3,368 |
| 企業健診など | 913 | 1,830 | 2,743 |
| 協会けんぽ | 589 | 680 | 1,269 |
| 市町村事業 | 182 | 215 | 397 |
| 総計 | 3,445 | 4,332 | 7,777 |

(図1)




判定区分について

健診における判定は、当院の判定基準分類(以下に提示)で行っている。

| 判定 | 指示 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| B | 軽度の変化が認められますが心配いりません。 |
| C | 経過観察を必要とします。 |
| D | 精密検査を必要とします。 |
| E | 治療をお続け下さい。 |

## (2)基本健診

| | 保健指導ﾚﾍﾞﾙ | | | |
|---|---|---|---|---|
| 性別 | 情報提供 | 動機付け支援 | 積極的支援 | 総計 |
| 男 | 1979 | 203 | 297 | 2479 |
| 女 | 2514 | 167 | 86 | 2767 |
| 総計 | 4493 | 370 | 383 | 5246 |







2023年度の情報提供対象者は、男性が1,979名(80%)、女性が2,514名(91%)である。
情報提供者は、前年度と比較して、ほぼ同様の割合であった。

保健指導レベルも、前年度と比較し情報提供、動機付け支援と積極的支援の割合は、ほぼ同様の割合であった。

## （3）対象検査別検診成績

| 対象部位 | 検査 | 受診者数（人）（A） | 要精検・治療者数（人）（B） | 要精検率（%）（B／A） | 精検受診者数（人）（C） | 精検受診率（%）（C／B） | 癌発見数（人）（D） | 癌発見率（%）（D／A） | 陽性反応適中度（%）（D／B） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 上部消化管X線 | 630 | 19 | 3.0 | 10 | 52.6 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| | 上部消化管内視鏡 | 3971 | 218 | 5.5 | 179 | 82.1 | 3 | 0.08 | 1.4 |
| 大腸 | 便潜血 | 4908 | 223 | 4.5 | 129 | 57.8 | 1 | 0.02 | 0.4 |
| | S状結腸内視鏡 | 3098 | 168 | 5.4 | 103 | 61.3 | 1 | 0.03 | 0.6 |
| | CTC | 200 | 24 | 12.0 | 10 | 41.7 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| 肺 | 胸部単純X線 | 4576 | 316 | 6.9 | 229 | 72.5 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| | 胸部CT | 2695 | 76 | 2.8 | 58 | 76.3 | 1 | 0.04 | 1.3 |
| 子宮 | 頚部細胞診 | 2307 | 63 | 2.7 | 47 | 74.6 | 6 | 0.26 | 9.5 |
| | 内診 | 2307 | 12 | 0.5 | 8 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| 乳腺 | マンモグラフィ | 2273 | 69 | 3.0 | 57 | 82.6 | 2 | 0.09 | 2.9 |
| | 乳腺超音波 | 2088 | 38 | 1.8 | 32 | 84.2 | 3 | 0.14 | 7.9 |
| 腹部 | 腹部超音波 | 4444 | 106 | 2.4 | 89 | 84.0 | 2 | 0.05 | 1.9 |
| 前立腺 | PSA | 1781 | 52 | 2.9 | 33 | 63.5 | 2 | 0.11 | 3.8 |
| 甲状腺 | 甲状腺超音波 | 817 | 48 | 5.9 | 43 | 89.6 | 1 | 0.12 | 2.1 |

## （4）検査別成績

### A. 胃がん検診

#### ① 上部消化管X線検査

受診者数は　男性330人　女性300人　合計630人　であった。
要医療は　男性11人　女性8人　合計19人　であった。
精検結果は下記表に記載した。

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| | 男 | 女 | 総計 |
| A | 284 | 223 | 507 |
| B | 26 | 59 | 85 |
| C | 9 | 10 | 19 |
| D | 11 | 8 | 19 |
| 総計 | 330 | 300 | 630 |

男




女




| 受診者 | 要精検 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 19 | 3.0% | 10 | 52.6% |

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過（治療方法） | 件数 |
|---|---|---|---|
| 胃炎 | 6 | 薬物療法 | 2 |
| 胃ポリープ | 2 | 除菌療法 | 2 |
| 異常なし | 2 | 治療不要 | 4 |
| | | 不明 | 2 |

要精検率は　3.0%であり　精検受診率は 52.6%であった
がん発見率は　0.00%　であった。

## ② 上部消化管内視鏡検査

受診者数は　男性2,059人　女性1,912人　合計3,971人 であった。
要医療は　男性128人　女性90人　合計218人 であった。
精検結果は下記表に記載した。

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| | 男 | 女 | 総計 |
| A | 120 | 202 | 322 |
| B | 947 | 989 | 1936 |
| C | 863 | 629 | 1492 |
| D | 128 | 90 | 218 |
| E | 1 | 2 | 3 |
| 総計 | 2059 | 1912 | 3971 |

男




女




| 判定 | 受診者 | 要精検 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要医療 | 3971 | 218 | 5.5% | 179 | 82.1% |

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過（治療方法） | 件数 |
|---|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | 1 | 薬物療法 | 24 |
| 食道の悪性新生物 | 2 | 除菌療法 | 3 |
| 胃MALTリンパ腫 | 1 | 経過観察 | 62 |
| 胃粘膜下腫瘍 | 15 | 内科的治療 | 2 |
| 食道粘膜下腫瘍 | 4 | 治療不要 | 50 |
| 胃炎 | 34 | 転院 | 3 |
| 胃潰瘍 | 3 | | |
| 胃ポリープ | 13 | | |
| 食道ポリープ | 3 | | |
| 逆流性食道炎 | 21 | | |
| その他 | 45 | | |
| 異常なし | 37 | | |

要精検率は　5.5%であり　精検受診率は 82.1%であった
がん発見率は　0.08%　であった。

## B. 大腸がん検診

### ① 免疫的便潜血検査(FOBT2日法)

受診者数は　男性2,359人　女性2,549人　合計4,908人 であった。
要精検は　男性114人　女性109人　合計223人 であった。
精検結果は下記表に記載した。

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| | 男 | 女 | 総計 |
| A | 2239 | 2434 | 4673 |
| C | 1 | 2 | 3 |
| E | 5 | 4 | 9 |
| D | 114 | 109 | 223 |
| 総計 | 2359 | 2549 | 4908 |

男




女




| 受診者 | 要精検・治療 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|
| 4908 | 223 | 4.5% | 129 | 57.8% |

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過(治療方法) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 結腸の悪性新生物 | 1 | 外科療法 | 2 |
| 大腸ポリープ | 55 | EMR | 5 |
| 潰瘍性大腸炎 | 3 | ポリペクトミー | 32 |
| 大腸憩室 | 7 | 経過観察 | 28 |
| 大腸炎 | 1 | 治療不要 | 18 |
| 痔核 | 12 | | |
| その他の大腸の異常 | 8 | | |
| その他の肛門・直腸の疾患 | 1 | | |
| 異常なし | 41 | | |

要精検率は　4.5%であり　精検受診率は 57.8%であった
がん発見率は　0.02%　であった。

## ② S状結腸内視鏡検査（FS）

受診者数は　男性1,585人　女性1,513人　合計3,098人 であった。
要精検は　男性114人　女性54人　合計168人 であった。
精検結果は下記表に記載した。

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| | 男 | 女 | 総計 |
| A | 1104 | 1263 | 2367 |
| B | 239 | 126 | 365 |
| C | 125 | 68 | 193 |
| E | 3 | 2 | 5 |
| D | 114 | 54 | 168 |
| 総計 | 1585 | 1513 | 3098 |

男




女




| 受診者 | 要精検 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|
| 3098 | 168 | 5.4% | 103 | 61.3% |

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過（治療方法） | 件数 |
|---|---|---|---|
| 大腸がん | 1 | EMR | 12 |
| 大腸ポリープ | 98 | ポリペクトミー | 78 |
| 大腸炎 | 2 | 外科療法 | 2 |
| 異常なし | 2 | 経過観察 | 4 |
| | | 内科的治療 | 1 |
| | | 治療不要 | 6 |

要精検・治療率は5.4%　精検受診率は 61.3%であった
がん発見率は　0.03%　であった。

C. 肺がん検診

① 胸部X線検査

受診者数は　男性2,122人　女性2,454人　合計 4,576人 であった。
要医療は　男性188人　女性128人　合計 316人 であった。
精検結果は下記表に記載した。

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| | 男 | 女 | 総計 |
| A | 1526 | 1890 | 3416 |
| B | 309 | 369 | 678 |
| C | 92 | 62 | 154 |
| E | 7 | 5 | 12 |
| D | 188 | 128 | 316 |
| 総計 | 2122 | 2454 | 4576 |

男




女




| 受診者 | 要精検 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|
| 4576 | 316 | 6.9% | 229 | 72.5% |

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過(治療方法) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 肺気腫 | 6 | 薬物療法 | 2 |
| 結核 | 1 | 経過観察 | 51 |
| 肺炎 | 1 | 治療不要 | 165 |
| 気管支炎 | 3 | 転院 | 1 |
| 気管支拡張症 | 1 | その他 | 3 |
| 非結核性抗酸菌症 | 2 | | |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 2 | | |
| 間質性肺炎 | 1 | | |
| その他(呼吸器系) | 90 | | |
| 異常なし | 122 | | |

要精検率は　6.9%であり　精検受診率は 72.5%であった
がん発見率は　0.00%　であった。

## ② 胸部CT検査

受診者数は　男性1,371人　女性1,324人　合計 2,695人 であった。
要医療は　男性41人　女性35人　合計 76人 であった。
精検結果は下記表に記載した。

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| | 男 | 女 | 総計 |
| A | 542 | 461 | 1003 |
| B | 608 | 662 | 1270 |
| C | 174 | 160 | 334 |
| D | 41 | 35 | 76 |
| E | 6 | 6 | 12 |
| 総計 | 1371 | 1324 | 2695 |

男




女




| 受診者 | 要精検・治療 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|
| 2695 | 76 | 2.8% | 58 | 76.3% |

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過（治療方法） | 件数 |
|---|---|---|---|
| 気管，気管及び肺の悪性新生物 | 1 | 外科療法 | 1 |
| 肺炎 | 1 | 薬物療法 | 2 |
| 炎症性変化 | 3 | 経過観察 | 34 |
| 肺気腫 | 2 | 治療不要 | 16 |
| 結節影 | 2 | 転院 | 1 |
| 非結核性抗酸菌症 | 1 | | |
| 気管支拡張症 | 1 | | |
| 気管支炎 | 2 | | |
| その他 | 39 | | |
| 異常なし | 6 | | |

D. 子宮がん検診

① 婦人科検診・子宮頚部細胞診

受診者数は 女性2,307人 であった。

要精検は 子宮頚部細胞診で 63人 婦人科診察で 12人 であった。

精検結果は下記表に記載した。

| ■婦人科細胞診判定 | 集計 |
|---|---|
| A | 659 |
| B | 1584 |
| C | 1 |
| D | 63 |
| 総計 | 2307 |

| ■婦人科内診判定 | 集計 |
|---|---|
| A | 934 |
| B | 804 |
| C | 557 |
| D | 12 |
| 総計 | 2307 |

■婦人科細胞診判定




■婦人科内診判定




| | 受診者 | 要精検・治療 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 婦人科細胞診 | 2307 | 63 | 2.7% | 47 | 74.6% |
| 婦人科内診 | 2307 | 12 | 0.5% | 8 | 66.7% |

婦人科細胞診

| 精検結果 内訳 | 件数 | 検査後の経過(治療方法) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 子宮頚部の悪性新生物 | 6 | 外科療法 | 3 |
| 子宮頚部軽度異形成 | 2 | 経過観察 | 34 |
| その他の婦人科疾患 | 31 | 転院 | 5 |
| 異常なし | 8 | 不明 | 5 |

婦人科内診

| 精検結果 内訳 | 件数 | 検査後の経過(治療方法) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 子宮筋腫 | 1 | 外科療法 | 1 |
| 子宮脱 | 1 | 薬物療法 | 1 |
| 腺腫様甲状腺腫 | 1 | 経過観察(12ヶ月) | 1 |
| その他(婦人科) | 2 | 転院 | 1 |
| 異常なし | 3 | 不明 | 4 |

子宮頚部細胞診 要精検率は 2.7%であり 精検受診率は 74.6%であった

婦人科診察要精検率は 0.5%であり 精検受診率は 66.7%であった

がん発見率は 婦人科細胞診 0.26% 婦人科内診 0.00% であった。

E. 乳がん検診

① マンモグラフィ
② 乳腺超音波検査

受診者数は　MMG　2,273人　乳腺超音波　2,088人　であった。
要精検は　MMG　69人　乳腺超音波　38人　であった。
精検結果は下記表に記載した。

| MMG | 集計 |
|---|---|
| A | 1853 |
| B | 237 |
| C | 108 |
| D | 69 |
| E | 6 |
| 総計 | 2273 |

| 乳腺超音波 | 集計 |
|---|---|
| A | 1473 |
| B | 495 |
| C | 81 |
| D | 38 |
| E | 1 |
| 総計 | 2088 |

MMG




乳腺超音波




| | 受診者 | 要精検 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MMG | 2273 | 69 | 3.0% | 57 | 82.6% |
| 乳腺超音波 | 2088 | 38 | 1.8% | 32 | 84.2% |

マンモグラフィ

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過（治療方法） | 件数 |
|---|---|---|---|
| 乳房の悪性新生物 | 2 | 外科療法 | 3 |
| 乳腺症 | 14 | 経過観察 | 20 |
| 乳房線維腺腫 | 12 | 転院 | 1 |
| 乳腺嚢胞 | 7 | 精査・加療 | 1 |
| その他の乳房疾患 | 14 | 治療不要 | 25 |
| 異常なし | 8 | 不明 | 8 |

乳腺超音波検査

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過（治療方法） | 件数 |
|---|---|---|---|
| 乳房の悪性新生物 | 3 | 外科療法 | 4 |
| 乳腺症 | 7 | 経過観察（12ヶ月） | 17 |
| 乳房線維腺腫 | 6 | 転院 | 2 |
| 乳腺嚢胞 | 5 | 精査・加療 | 1 |
| その他の乳房疾患 | 11 | 治療不要 | 8 |

マンモグラフィ 要精検率は　3.0%であり　精検受診率は 82.6%であった
乳腺超音波検査 要精検率は　1.8%であり　精検受診率は 84.2%であった
マンモグラフィのがん発見率は　0.09%　であった。
乳腺超音波検査のがん発見率は　0.14%　であった。

## F. オプション検査

### ① 腹部超音波検査

受診者数は　男性2,258人　女性2,186人　合計4,444人 であった。
要医療は　男性51人　女性55人　合計106人 であった。

精検結果は下記表に記載した。

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| | 男 | 女 | 総計 |
| A | 260 | 496 | 756 |
| B | 624 | 655 | 1279 |
| C | 1313 | 976 | 2289 |
| E | 10 | 4 | 14 |
| D | 51 | 55 | 106 |
| 総計 | 2258 | 2186 | 4444 |

男




女




| 受診者 | 要精検 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|
| 4444 | 106 | 2.4% | 89 | 84.0% |

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過（治療方法） | 件数 |
|---|---|---|---|
| 膀胱の悪性新生物 | 1 | 外科療法 | 5 |
| 腎（腎盂を除く）の悪性新生物 | 1 | 内科的治療 | 1 |
| 膵のう胞 | 14 | 薬物療法 | 1 |
| 腎のう胞 | 2 | 食事療法 | 1 |
| 肝のう胞 | 3 | 経過観察 | 52 |
| 脂肪肝 | 3 | 治療不要 | 26 |
| 胆嚢腺筋症 | 5 | 転院 | 3 |
| 肝血管腫 | 8 | | |
| 胆のうポリープ | 5 | | |
| 尿路結石 | 2 | | |
| その他 | 33 | | |
| 異常なし | 12 | | |

要精検率は　2.4%であり　精検受診率は 84.0%であった
がん発見率は　0.05%　であった。

## ② 前立腺腫瘍マーカー(PSA)

受診者数は　男性1,781人 であった。
要精検は　52人 であった。
精検結果は下記表に記載した。

| ■PSA判定 | 集計 |
|---|---|
| A | 1693 |
| C | 24 |
| D | 52 |
| E | 12 |
| 総計 | 1781 |

■PSA判定




| 受診者 | 要精検 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|
| 1781 | 52 | 2.9% | 33 | 63.5% |

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過(治療方法) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 前立腺の悪性新生物 | 2 | 薬物療法 | 3 |
| 前立腺肥大症 | 13 | 経過観察 | 19 |
| 前立腺炎 | 2 | 治療不要 | 11 |
| その他(腎･泌尿器系) | 6 | | |
| 異常なし | 10 | | |

要精検率は　2.9%であり　精検受診率は 63.5%であった
がん発見率は　0.11%　であった。

## ③ 甲状腺超音波検査

受診者数は　男性63人　女性754人　合計817人 であった。
要精検は　男性2人　女性46人　合計48人 であった。
精検結果は下記表に記載した。

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| | 男 | 女 | 総計 |
| A | 19 | 185 | 204 |
| B | 16 | 306 | 322 |
| C | 25 | 197 | 222 |
| E | 1 | 20 | 21 |
| D | 2 | 46 | 48 |
| 総計 | 63 | 754 | 817 |

男




女




| 受診者 | 要精検・治療 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|
| 817 | 48 | 5.9% | 43 | 89.6% |

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過（治療方法） | 件数 |
|---|---|---|---|
| 甲状腺の悪性新生物 | 1 | 経過観察 | 34 |
| 甲状腺腫(機能正常) | 8 | 治療不要 | 1 |
| 甲状腺炎 | 6 | 転院 | 2 |
| 甲状腺機能低下 | 2 | 不明 | 6 |
| 甲状腺機能亢進 | 1 | | |
| 腺腫様甲状腺腫 | 21 | | |
| その他(甲状腺) | 3 | | |
| 異常なし | 1 | | |

要精検率は　5.9%であり　精検受診率は 89.6%であった
がん発見率は　0.12%　であった。

## ④ CTコロノグラフィ検査

受診者数は　男性132人　女性68人　合計200人 であった。
要医療は　男性17人　女性7人　合計24人 であった。
精検結果は下記表に記載した。

| | 性別 | | |
|---|---|---|---|
| ■大腸CT判定 | 男 | 女 | 総計 |
| A | 77 | 52 | 129 |
| B | 24 | 5 | 29 |
| C | 14 | 4 | 18 |
| D | 17 | 7 | 24 |
| 総計 | 132 | 68 | 200 |

男




女




| 受診者 | 要精検 | 要精検率 | 精検受診者 | 精検受診率 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 24 | 12.0% | 10 | 41.7% |

| 精検結果　内訳 | 件数 | 検査後の経過（治療方法） | 件数 |
|---|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 8 | EMR | 1 |
| その他 | 2 | ポリペクトミー | 6 |
| | | 経過観察 | 3 |

要精検率は　12.0%であり　精検受診率は 41.7%であった
がん発見率は　0.00%　であった。

## （5）発見がん一覧

| | 診断結果 | 検診検査法 | 検査法 | 性別 | 年齢 | 治療方法 | 当センター受診歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIN3 | 子宮頸部細胞診検査 | コルポスコピー | 女 | 22 | 転院 | 2回目 |
| 2 | CIN3 | 子宮頸部細胞診検査 | 経腟US HPV コルポスコピー生検 | 女 | 30 | 外科療法 | 初回 |
| 3 | 甲状腺がん | 甲状腺US | 触診 US 血液検査 | 男 | 38 | 外科療法 | 5回目 |
| 4 | CIN3(HPV16陽性) | 子宮頸部細胞診検査 | コルポスコピー 組織診 HPV | 女 | 42 | 外科療法 | 3回目 |
| 5 | 直腸カルチノイド | FS | TCS | 女 | 43 | 外科療法 | 2回目 |
| 6 | CIN3 | 子宮頸部細胞診検査 | コルポ下生検 | 女 | 46 | 外科療法 | 2回目 |
| 7 | CIN3 | 子宮頸部細胞診検査 | コルポスコピー 組織診 | 女 | 49 | 転院 | 2回目 |
| 8 | 乳がん | MMG | CNB MMG US | 女 | 52 | 外科療法 | 初回 |
| 9 | CIN3 | 子宮頸部細胞診検査 | コルポスコピー下生検 | 女 | 54 | 転院 | 3回目 |
| 10 | 硬がん（早期） 右Bp＋SCNB | MMG | MG US CNB | 女 | 55 | 外科療法 | 8回目 |
| 11 | 硬癌(早期) | 乳腺超音波検査 | MMG、US、CNB | 女 | 55 | 外科療法 | 9回目 |
| 12 | 食道扁平上皮内腫瘍SIN | 上部消化管内視鏡検査 | GF 生検 | 女 | 56 | 転院 | 7回目 |
| 13 | 肺腺がん | 胸部CT検査 | 未記入 | 女 | 58 | 外科療法 | 4回目 |
| 14 | 左乳がん | 乳腺超音波検査 | MMG US CNB | 女 | 59 | 外科療法 | 2回目 |
| 15 | 右腎がん | 腹部超音波検査 | 造影CT、腹部US、診察 | 男 | 62 | 転院 | 15回目 |
| 16 | 左乳がん | 乳腺超音波検査 | MMG US ABC CNB | 女 | 63 | 外科療法 | 4回目 |
| 17 | 膀胱腫瘍 | 腹部超音波検査 | 膀胱鏡 | 男 | 64 | 外科療法 | 17回目 |
| 18 | 食道癌 | 上部消化管内視鏡検査 | GF 生検 | 男 | 65 | 転院 | 7回目 |
| 19 | 前立腺がん | 腫瘍マーカー（PSA） | 生検 | 男 | 69 | 経過観察 | 6回目 |
| 20 | 直腸がん | 便潜血検査 | FS | 女 | 70 | 外科療法 | 初回 |
| 21 | 早期胃がん | 上部消化管内視鏡検査 | CT 内視鏡 生検 | 男 | 73 | ESD | 13回目 |
| 22 | 前立腺がん | 腫瘍マーカー(PSA) | 生検 | 男 | 82 | 経過観察(3ヵ月後) | 初回 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |